

380 Mosquitero común



Mosquitero común. Primavera. Adulto (20-III).

MOSQUITERO COMÚN (*Phylloscopus collybita*)

IDENTIFICACIÓN

11-12 cm. Partes superiores pardo oliváceas, teñidas de marrón; pecho con tonos ocre y amarillos; zona auricular y cuello de tonos marrones-grisáceos; patas oscuras. En el ala, la 6ª, 7ª y 8ª primarias tienen la misma longitud, la 9ª primaria es igual a la 3ª o entre la 3ª y la 4ª y están emarginadas hasta la 5ª.

ESPECIES SIMILARES

Es difícil de separar de algunas especies próximas. El **mosquitero ibérico** es de coloración similar al mosquitero musical y sólo la 7ª y 8ª primaria son iguales. El **mosquitero musical** es más amarillo y con patas claras; tiene emarginada sólo hasta la 6ª primaria. El **mosquitero papialbo** es blanco por debajo y tiene muy marcado el obispillo amarillo, que contrasta con la espalda verde. El **zarcero común** es de mayor tamaño, amarillo uniforme por debajo y pico ancho en la base.



Mosquitero ibérico

Mosquitero musical



Mosquitero papialbo

Zarcero común

SEXO

Ambos sexos son de plumaje similar, no siendo posible su diferenciación.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:


Juveniles con plumaje nuevo.

1º año otoño/2º año primavera con contraste entre las plumas del ala cambiadas y retenidas; puede existir también contraste en las plumas de la cola (cambian habitualmente el par central).

Adultos con todo el plumaje de la misma generación.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele terminar a finales de octubre. Muda **postjuvenil** parcial, terminada en septiembre, que incluye toda o parte de la cola y las pequeñas y grandes coberteras más internas; hay ejemplares que extienden más su muda a todas las grandes coberteras y parte de las plumas de vuelo, dejando siempre sin cambiar las coberteras primarias. Tanto jóvenes como adultos tienen muda **prenupcial** entre diciembre y abril, cambiando parte de las grandes coberteras, terciarias y plumas de la cola. **CUIDADO:** los adultos muestran entonces límite de muda.



Mosquitero común. Extensión de la muda postjuvenil.

■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares




FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Es una especie nidificante en zonas con microclimas húmedos y frescos de los Pirineos. Invernante común en zonas bajas con aves de toda Europa.

380 Mosquitero común



Mosquitero común. Color de las patas y fórmula alar: emarginación hasta la 5ª primaria; primarias 6ª, 7ª y 8ª de la misma longitud.

Mosquitero común. Primavera. Diseño de la cabeza: arriba izquierda adulto (20-III); arriba derecha 2º año (20-III); izquierda juvenil (18-VII).



Mosquitero común. Primavera. 2º año (20-III).



Mosquitero común. Primavera. Juvenil (18-VII).

Mosquitero común. Primavera. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto (20-III); arriba derecha 2º año (20-III); izquierda juvenil (18-VII).

380 Mosquitero común



Mosquitero común. Primavera. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto (20-III); arriba derecha 2º año (20-III); izquierda juvenil (18-VII).


Mosquitero común. Primavera. Adulto: diseño del ala (20-III).



Mosquitero común. Primavera. 2º año: diseño del ala (20-III).



Mosquitero común. Primavera. Diseño de la cola: arriba izquierda adulto (20-III); arriba derecha 1º año con muda prenupcial (20-III); izquierda 1º año con todas las plumas juveniles (20-III); abajo juvenil (18-VII).



Mosquitero común. Primavera. 2º año: diseño del ala (1 muda postjuvenil; 2 muda prenupcial) (20-III).

380 Mosquitero común



Mosquitero común. Primavera. Juvenil: diseño del ala (08-VII)




Mosquitero común. Diseño de la cabeza: izquierda adulto (01-XI); derecha 1º año (30-XI).



Mosquitero común. Diseño del pecho: izquierda adulto (01-XI); derecha 1º año (30-XI).



Mosquitero común. Otoño. Adulto (01-XI).




Mosquitero común. Otoño. 1º año (30-XI).




Mosquitero común. Otoño. Diseño de la cola: arriba izquierda adulto (22-X); arriba derecha 1º año con el par central de plumas mudado (02-X); izquierda 1º año con todas las plumas juveniles (10-XI).

380 Mosquitero común



Mosquitero común. Otoño. Diseño del dorso: izquierda adulto (22-X); derecha 1º año (30-XI).



Mosquitero común. Otoño. Adulto: diseño del ala (22-X).



Mosquitero común. Otoño. 1º año: diseño del ala (30-XI).